

Recherche abeille sauvage

**Participer à la recherche de
l'Andrène de la Knautie en Picardie**



Pourquoi cette abeille ?

L'espèce est probablement en déclin dans le Nord de l'Europe. Les milieux qu'elle affectionne se raréfient ou se dégradent mais elle n'a pas encore totalement disparu de nos paysages. Il nous faut en savoir plus !


Comment ? A partir de bonnes photographies.

Quand ? Dès le printemps et jusqu'en fin d'été. **Où ?** Dans tous les petits coins de nature où fleurissent la scabieuse colombarie ou la knautie des champs



**Association des Entomomogistes
de Picardie**

adepentomo.fr



*L'Andrène de la Knautie
(Andrena hattorfiana)*

*Les grains de pollen récoltés
sont roses !*



Aspect : c'est une « grande abeille » longue de 11 à 16 mm. L'abdomen est en partie rouge à complètement noir. La face du mâle est jaunâtre. L'espèce butine exclusivement sur des fleurs de scabieuse colombaire ou knautie des champs. **Vol** : fin mai à août. **Milieu** : coteau calcaire, prairie non amendée, bord de culture agricole, bord de route, ourlet forestier, pâturage sec. Egalement en contexte périurbain. Ne pas hésiter à multiplier les visites sur un site très favorable.

Vos photographies

Elles doivent obligatoirement être accompagnées des renseignements suivants : nom et prénom du photographe, date du cliché, nom de la commune (voire le lieu-dit) et département concerné (Aisne, Oise, ou Somme). Renseigner le type de milieu associé au cliché serait très utile.

Vos photos peuvent être déposées au choix vers :

- la base de données Clicnat (<http://www.clicnat.fr>)
- l'ADEP (secretariat@adepentomo.fr)
- le réseau d'étude Abeilles sauvages de Picardie :
Luc Plateaux, Coordinateur (lucodplateaux@gmail.com)
Emmanuel Vidal (vidalmanu80@gmail.com)



Association des Entomomogistes
de Picardie

adepentomo.fr

