

Conférence

faune sauvage 2017

Araignées nouvelles pour la France découvertes en Hauts-de-France

Association des entomologistes de Picardie,

Groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais,

Picardie Nature



Les réseaux d'études Araignées

○NORD – PAS-de-CALAIS

- Création du réseau : 1999
- 25 membres en 2017
- Base de données / internet : « SIRF » / GON
- 20110 données Araignée, fin 2016

○PICARDIE

- Création du réseau : 2012
- 68 membres en 2017,
- Base de données / internet : « Clicnat » / Picardie Nature
- 9978 données Araignée, 2017



Découverte en 2013
(Somme, Nord)
Milieu : de la forêt au jardin...
Statut : relativement bien répartie
en Europe



Harpactea rubicunda



Harpactea rubicunda

Maison individuelle à Wiencout-l'Équipée, Somme

Donnée naturaliste isolée – réseau d'étude Araignée de Picardie Nature / ADEP



Harpactea rubicunda

Jardin privatif à Roost-Warendin, Nord

Donnée naturaliste isolée – réseau d'étude Araignée GON

Découverte en 2013

(Aisne, Oise, Ain)

Milieu : Zone humide, vielle forêt

Statut : rare en Europe

Diplocephalus dentatus





Diplocephalus dentatus

Forêt humide de Samoussy, Aisne

Etude aranéologique commanditée par l'Office National des Forêts (ONF) dans le cadre d'un projet de Réserve Biologique Dirigée.

Découverte En 2009
(Nord, Pas-de-Calais, Somme)
Milieu : sablonneux sec
Statut : localisée surtout en zone littorale

Clubiona frisia





Dunes couvertes d'oyats, Bray-Dunes, Nord

Donnée naturaliste isolée – réseau d'étude Araignée GON

Découverte en 2014
(Somme, Meuse)
Milieu : Zone humide, roselière
Statut : rare et localisée en
Europe

Tetragnatha shoshone





Tetragnatha shoshone

Marais tourbeux, Blangy-Tronville, Vallée de la Somme

Inventaire aranéologique bénévole sur site CEN Picardie – Réseau d'étude Araignée ADEP / Picardie Nature



Tetragnatha shoshone

Marais tourbeux, Moreuil, Vallée de la l'Avre

Inventaire aranéologique bénévole sur site CEN Picardie – Réseau d'étude Araignée ADEP / Picardie Nature

Découverte en 2012
(Aisne, Nord, Seine-et-Marne)
Milieu : zone humide, friche...
Statut : rare et très localisée en
Europe

Nerienne hammeni





Nèriene hammeni

Bordure d'un petit étang dans une roselière, Locquignol, Nord

Donnée naturaliste isolée – réseau d'étude Araignée GON

Découverte en 2012
(Aisne)

Milieu : principalement dans les
montagnes, biologie inconnue

Statut : relativement rare

Araniella proxima





Araniella proxima

Boisement ouvert et broussaille, Césières, Aisne

Donnée naturaliste isolée sur site CEN Picardie – Réseau d'étude Araignée Picardie Nature / ADEP

Découverte en 2013
(Aisne, Somme) et (Seine-et-Oise,
Seine-et-Marne, Loiret, Aube)
Milieu : zone humide
Statut : semble rare et localisée en
Europe

Heriaeus graminicola





Heriaeus graminicola

Marais tourbeux, Daours, vallée de la Somme

Inventaire aranéologique bénévole dans le cadre d'une valorisation auprès de la commune – Association des tourbiers de Picardie / ADEP

Découverte en 2017
(Oise)
Milieu : forêt ancienne
Statut : exceptionnelle (Europe)

Anyphaena furva





Anyphaena furva

Forêt d'Ermenonville, Fontaine-Chaalis, Oise

Etude aranéologique commandité par le PNR Oise Pays de France dans le cadre d'un projet de Réserve Biologique Dirigée – ADEP / ONF / DREAL

Revue Arachnologique

Série 2



Numéro 1 - Mai 2014

Association Française d'Arachnologie – www.asfra.fr

Publication nationale

AsFra Association française d'arachnologie



Référencement européen

Citation: Nentwig W, Blick T, Gloor D, Hänggi A, Kropf C: Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch



Araneidae Clerck, 1757 / **Araniella** Chamberlin & Ivie, 1942 7 species

Araniella proxima (Kulczyński, 1885)

Description

Male palp with long median apophysis, uniformly bent sickle-like toward tip. Epigyne with narrow scapus (1/2 width of epigyne at most), tapering and reaching far beyond epigyne. Epigyne deeply incised on both sides of scapus and with strongly sclerotised tails. Prosoma light brown to brown, male: almost always with dark marginal band. Opisthosoma dorsally with 0-4 pairs of black lateral spots, ventrally almost unexceptionally without distinct spots within (not always) dark median field.

Body length male: 4.5-5.5 mm

Body length female: 6-8 mm


Additional information

Mainly in the mountains. Biology mostly unknown

WSC LSID urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:015331

[Key to genera](#) | [Key to species](#)

Distribution



Au final

Depuis 2012, 8 espèces nouvelles (ou presque) pour la France

8 espèces remarquables (rareté, repartition)

Associées à des milieux dans un état de naturalité marqué


Des enjeux de conservations

Des méthodologies hétérogènes

Des appuis partenariaux indispensables (réseaux – financeurs)

(novembre 2017, Sylvain Lecigne, Emmanuel Vidal)

Photos : E. Vidal, S. Legris, S. Lecigne, J;P. Taberlet, C. Lebeau



Araignées nouvelles pour la France découvertes en Hauts-de-France

Les partenaires

